



Edition
Grandes Cultures

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

BULLETIN TECHNIQUE N° 22

22 JUILLET 1993

MAIS : Pyrale : Toujours des captures et des pontes.
Pucerons : Peu d'évolution ; présence variable selon les parcelles

BETTERAVES : Aucun symptôme de maladies à ce jour.

- MAIS DOUX - HARICOT -

PYRALE :

Situation :

Des captures sont toujours enregistrées.

Des dépôts de pontes ont encore lieu : 6 % dans les secteurs de Mer (41), Beaugency (45) et 2 % en Sologne.

Préconisation :

SURVEILLENZ VOS CULTURES.

Renouvelez le traitement s'il remonte à 10-15 jours. Préférez alors une pyrèthrinoïde liquide pour protéger l'épi.

PUCERONS :


Intervenez en début de colonisation avec un produit à effet de vapeur (PIRIMOR G).

- MAIS GRAIN -

PUCERONS :

Les captures de *Sitobion avenae* et *Rhopalosiphum padi* à la tour à succion sont toujours faibles (voir graphiques ci-dessous).

Captures de *Sitobion avenae*



Publication périodique


ABONNEMENT ANNUEL : 240 F

Ministère de l'Agriculture et de la Forêt
 Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
 SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
 BP 210 - 93, rue de Curambourg
 45403 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
 Tél. 38.86.36.24

FAX 38.86.19.79



Captures de *Rhopalosiphum padi*



En culture, leur présence est variable selon les parcelles. Les auxiliaires restent actifs et **devraient limiter les risques de pullulations.**

Cependant, surveillez attentivement les parcelles traitées avec des pyréthrinoides, la présence de *R. padi* pendant la floraison peut avoir une incidence sur le développement de fumagine.

La période de sensibilité à ce puceron s'arrête trois semaines après fécondation.

Le seuil d'intervention d'une panicule sur deux colonisée n'est que très rarement atteint : secteur de Montbouy, St Hilaire sur Puiseaux, Beaugency (45), St Julien sur Cher (41).

Dans ce cas seulement, intervenez, si ce n'est déjà fait, avec PIRIMOR G à 0,35 kg/ha ; vous respecterez la faune utile.

- BETTERAVES -

MALADIES :

Aucun symptôme de maladie (Oïdium, Cercosporiose, Ramulariose et Rouille).

Aucun traitement fongicide ne se justifie actuellement. Il faut attendre l'apparition des premiers symptômes.